

## ÖZELLİKLERİ:

Cytoplex Plus, deniz yosunundan elde edilen NPK'lı sıvı organomineral gübredir.

## KULLANIM ŞEKLİ:

Yaprak uygulamasında ilaçlama aletinin deposu yanına kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen dozda Cytoplex Plus az su ile ayrı bir kapta karıştırıldıktan sonra depoya eklenir. Karıştırma düzeni çalıştırılır ve depo su ile doldurularak bitkilere pülverize edilir. Bitkinin tümüne iyi bir kaplama yapacak şekilde Cytoplex Plus püskürtülür. Toprakten uygulama için tavsiye edilen doz damlama sulama sistemine veya sulama kanallarına doğrudan katılır.

## KULLANILDIĞI YERLER VE DOZLARI

### 1-DOMATES

6-8 yapraklı dönemde sıraya 15 ml/da dozunda uygulanır. İlk uygulamadan 3 hafta sonra 30 ml/da dozunda ikinci uygulama yapılır. 2 haftada bir aralıklarla 60 ml/da dozunda yaprakten verilen kalsiyumlu gübrelerle veya diğer gübrelerle birlikte karıştırılarak uygulanır.

### 2-BİBER,PATLICAN

3-5 yapraklı dönemde çiçeklenme ile birlikte 15-30 ml/da dozunda uygulanır. 7-14 gün aralıklarla ile 4-6 kez tekrarlanır.

### 3-KABAK

2-4 yapraklı dönemde 20 ml/da dozunda uygulanır. Çiçeklenme başlangıcında 60 ml/da dozunda uygulanır. Aynı doz iki hafta aralıklarla birkaç kez tekrarlanır.

### 4-SERT KABUKLU MEYVELER(badem, ceviz, fındık, fıstık)

Kabuk içindeki meyve yarı büyüklüğüne ulaştığında 50 ml/100 lt su dozunda uygulanır ve 1 ay sonra tekrarlanır. Yapraktan kalsiyum veya çinko uygulamaları yapılırken karışım (100 litre suya) 50 ml Cytoplex Plus ilave edilir. Çiçeklenme öncesinde aynı dozda uygulanır.

### 5-BAĞ

Genel Uygulama: Yaprak gübresi ve pestisit uygulamaları ile beraber 30 ml/da dozda Cytoplex karışım tankına ilave edilir.

Gibberellik Asit uygulamalarında tankta Cytoplex Plus aynı dozda eklenir.

Hasatın 5-10 gün önce yüksek potasyum içeren gübrelerle birlikte verilir.

### 6-ÇİLEK

Dinlenme döneminden çıkmadan 2-3 hafta önce 60 ml/da dozunda uygulanır.

Çiçeklenme başlangıcında aynı dozda uygulanır ve 2 hafta sonra tekrarlanır.

### 7-MEYVELER (sert ve yumuşak çekirdekli)

Tomurcuklar patlarken 50 ml/100 lt su dozunda uygulanır.

Taç yapraklarının dökülmesinden 1 hafta sonra ikinci uygulama yapılır.

Meyve dökümünden 1 hafta önce üçüncü uygulama yapılır.

Meyve dökümünden 20-30 gün sonra dördüncü uygulama yapılır.

### 8-HAVUÇ ve DİĞER KÖKLERİ YENEN BİTKİLER

Fideler 3-6 yapraklı iken 60 ml/da dozunda uygulanır. 2-4 hafta ara ile 30 ml/da dozunda tekrarlanır.

### 9-MISIR

Ekim öncesi ve sonrasında tohum yatağında 15 ml/da dozunda uygulanır. 3-5 yapraklı dönemde sıraya 40 ml/da dozunda uygulanır. Aynı dozda iki hafta sonra tekrarlanır.

### 10-PAMUK

Ekim esnasında tohum yatağında 10 ml/da dozunda uygulanır. Çiçeklenme başlangıcında 50 ml/da dozunda uygulanır.

### 11-ŞEKER PANCARI

6-8 yapraklı dönemde sıra üzerine 30 ml/da dozunda püskürtülür. İlk uygulamadan 30 gün sonra 60 ml/da dozunda uygulanır.

Piyasaya sunacağımız CYTOPLEX PLUS adlı ürünün etiketinin yönetmeliğe uygun olarak hazırlandığını ve piyasada bu etiket kullanıldığını beyan eder, aksi takdirde 4703 Sayılı Kanun gereğince yapılacak tüm soruşturma ve ceza müeyyideleri peşinen kabul ederiz.

## ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

### CYTOPLEX PLUS

## NPK'lı Sıvı Organomineral Gübre

### Garanti Edilen İçerik:

Toplam Organik Madde..... %10

Toplam Azot(N)..... %3

Üre Azotu(N)..... %5

Toplam Fosfor Pentaoksit(P2O5)..... %5

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5)..... %4

Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O)..... %0.5

Algünik asit ..... pH:5.5-7.5

Maximum Cl: %0.5

### DİKKATI

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN VE GIDA MADDELERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

DERİ VE GÖZ TEMASINDAN, SOLUMAKTAN KAÇININIZ.

SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ.

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ.

TOPRAK VENVEYA YAPRAK ANALİZİ YAPTIRILMADAN

KULLANILMASI TAVSİYE EDİLMEZ.



**Unifarm**  
chemical

Unifarm Chemical Tarım Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.  
Kurtuluş Mh. 26 Cd. No: 6, Doğanbey (ANTALYA)  
Tic Sic No: 272069 / 312 06 90-312 06 94 (0242) 312 06 94  
Mersis No: 0892029336100014  
Tic Sic Kurumlar Vergi Dairesi No: 892 029 3361  
www.unifarmchemical.com • www.unifarmchemical.com

## 12-TURUNÇGİLLER

Tomurcuklar patlarken 50 ml/100 lt su dozunda uygulanır. Taç yapraklarının dökülmesinden 1 hafta sonra uygulama tekrarlanır. Haziran dökümünden 1 hafta önce üçüncü uygulama yapılır. Haziran dökümünden 20-30 gün sonra dördüncü uygulama yapılır.

## 13-KAVUN, KARPUZ ve Diğerleri

2-4 yapraklı dönemde sıra üzerine 15 ml/da dozunda uygulanır. İlk uygulamadan 2 hafta sonra 40 ml/da dozunda kaplama uygulama yapılır.

## 14-MUZ

Çiçeklenme başlangıcında 50 ml/100 lt su dozunda uygulanır. İkinci uygulama meyve oluşumundan sonra aynı dozda uygulanır. Üçüncü uygulama meyvelerin gelişme aşamasında aynı dozda tekrarlanır.

## 15-PATATES

Kombine patates mibzeri ile sıraya tohum ekiminde gübreye 30 ml/da dozunda karıştırılır. Tohumluk yumrular sürgün(stolon) vermeye başladığında 40 ml/da dozunda uygulanır. İkinci uygulamadan 2-4 hafta sonra yaprakten 60 ml/da dozunda uygulanır.

## 16-ÇİM

Çiğış tamamlandıktan sonra çim sahalarna 2-4 hafta aralıklarla 40 ml/da dozunda uygulanır.

## 17-SÜS BİTKİLERİ

İlk uygulama tomurcuklanma döneminde 30 ml/da dozunda, ikinci uygulama çiçeklenme döneminde aynı dozda uygulanmalıdır.

## ŞAŞIRTMA DÖNEMİ:

Dikimden önce bitkilerinizi 100 lt suya 30 cc'lik solüsyona daldırıp dikişiniz.

## KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:

Cytoplex, normal olarak kullanılan zirai ilaçlar ve yaprak gübreleri ile karıştırılabilir. Karışımından emin olunmayan ilaçlar için ön deneme yapılması tavsiye edilir.

## DEPOLAMA DURUMU:

Serin ve kuru yerlerde -10°C - +30°C ısı aralığında depolandığında ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

## FİRMA BEYANI:

İmalatçı firma ürünün kalitesini ve özelliklere uygun olduğunu teyit eder.İmalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden oluşabilecek zarar riski alıcıya aittir.

## Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Bakanlık Lisans No:

Bakanlık Tescil No:

Şarj No:

Net Miktarı :

Brüt Ağırlığı:

Üretici Firma:

MILLER CHEMICAL AND FERTILIZER LLC

P.O.Box 333,120 Radio Road Hanover,Pennsylvania 17331 U.S.A.  
Tel:717-632-8921 Fax:717-632-9638

İthalatçı Firma:

UNIFARMCHEMICAL TARIM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

AOSB 2.KİSİM 26.CAD. NO:6 DOŞEMEALTI ANTALYA-TURKEY

Tel.+90 242 312 06 90-92 Fax. +90 242 312 06 94

www.unifarmchemical.com / unifarm@unifarmchemical.com